

لطفا 3 عدد پودر نوناپگ+ () عدد قرص بیزاکودیل+4 بسته پودر پیدرولاکس+1 عدد شیاف بیزاکودیل را از داروخانه تهیه فرمایید.

تاریخ	روز	داروها
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5

دستورالعمل استفاده ی داروها:

هر بسته پودر پیدرولاکس را در 4 لیوان آب حل کنید و از ساعت 16 (4 بعد از ظهر) تا ساعت 22 (10 شب) به فاصله یک ساعت و نیم، یک لیوان میل شود. 1 عدد قرص بیزاکودیل را ساعت 18 (6 عصر) و یک عدد قرص بیزاکودیل دیگر را ساعت 23 (11 شب) میل کنید. لازم به ذکر است دستورالعمل داروها طبق روزهای داده شده است.

*بیماران پیوند کبد و نارسایی کلیوی و دیابت و سن بالای 80 سال حتما قبل از شروع به انجام آمادگی جهت چک آزمایش کراتنین به آزمایشگاه مراجعه کرده و جواب تست را با شماره **54534000** داخلی **3** اطلاع دهید.

- از چهار روز قبل از انجام کولونوسکوپی حبوبات، میوه و لبنیات میل نشود.
- از چهار روز قبل از انجام کولونوسکوپی هر گونه میوه های دانه دار مثل انار، انگور، کشمش، کیوی، هندوانه، گوجه فرنگی و بادمجان میل نشود.
- اگر داروهای خاصی مانند آسپرین یا سایر رقیق کننده های خون مانند وارفارین پلاویکس اسویکس و آپیکسابان، آکساین و... استفاده میکنید یا به دیابت و بیماری های قلبی ریوی و یا مغزی مبتلا هستید پزشک معالج خود را در جریان قرار دهید.
- اگر به بیماری واگیر دار ویروسی، تب خال، زگیل ناحیه تناسلی، هپاتیت و ایدز مبتلا هستید حتما با ما در میان بگذارید.

لطفا صفحه ی بعد را مطالعه بفرمایید.

- لطفا نوار قلب داشته باشید. روز قبل انجام شود یا روز انجام کار 1 ساعت زودتر مراجعه فرمایید تا انجام شود. لازم به ذکر است نوار قلب شما تا یک ماه اعتبار دارد.

- روز قبل از انجام کولونوسکوپی ساعت 7:30 صبح، یک کف دست نان تست با عسل میل شود، از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ظهر، هیچ ماده غذایی جامدی از جمله انواع میوه جات (حتی هندوانه و خربزه) میل نفرمایید، در این فاصله، (از ساعت 8 تا 12 ظهر) 8 تا 10 لیوان مایعات زلال و صاف شده (آب، چای کمرنگ و عسل، شربت گلاب، شربت به لیمو، شربت آب لیمو بدون پالپ و هر مایع شفافی که بتوان از پشت لیوان روزنامه خواند) میل کنید.
- ساعت 13 (1 بعد از ظهر) پودر نونا پگ اول را در نصف لیوان آب سرد حل کرده و به مدت ده دقیقه صبر کنید تا آن مایع به دمای محیط برسد و سپس میل کنید. پس از خوردن پودر تا ده دقیقه چیزی میل نشود. بعد از میل کردن پودر 2 عدد قرص بیزاکودیل میل شود.
- از فاصله ساعت 13 (1 بعد از ظهر) تا ساعت 19 (7 بعد از ظهر) حدود 10 تا 15 لیوان از مایعات شفاف ذکر شده را میل کنید ، تا آخر شب به هیچ عنوان هیچ نوع ماده غذایی جامدی میل نفرمایید.
- ساعت 19 (7 بعد از ظهر) پودر نوناپگ دوم را در نصف لیوان آب سرد حل کرده و پس از این که به دمای محیط رسید (بعد از 10 دقیقه) به همراه 2 عدد قرص بیزاکودیل میل کنید. پس از خوردن پودر و قرص تا ده دقیقه چیزی میل نشود. سپس حدود 10 تا 15 لیوان از مایعات شفاف ذکر شده میل شود.
- روز انجام کولونوسکوپی، ساعت 5 صبح، پودر نوناپگ سوم به همراه 2 قرص بیزاکودیل را در نصف لیوان آب سرد حل کرده و پس از ده دقیقه میل کنید و تا ساعت 7 صبح، 6 لیوان مایعات شفاف ذکر شده میل کنید.
- پس از میل کردن پودر در ساعت 5:10 صبح 10 دقیقه صبر کنید و از ساعت 5:20 صبح تا ساعت 7 صبح 6 لیوان مایعات شفاف ذکر شده را میل نمایید (مدت زمان 1 ساعت و 40 دقیقه برای خوردن 6 لیوان مایعات شفاف فرصت دارید)
- شیاف بیزاکودیل را روز انجام کولونوسکوپی ساعت 10 صبح استفاده شود.
- از ساعت 7 صبح تا زمان انجام کولونوسکوپی، ناشتای کامل باشید حتی آب هم میل نکنید.