

لطفا 3 عدد پودر نوناپگ+ () عدد قرص بیزاکودیل+4 بسته پودر پیدرولاکس+1 عدد شیاف بیزاکودیل را از داروخانه تهیه فرمایید.

تاریخ	روز	داروها
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5
		یک بسته پودر پیدرولاکس 70 گرمی+دو عدد قرص بیزاکودیل 5

دستورالعمل استفاده ی داروها: هر بسته پودر پیدرولاکس را در 4 لیوان آب حل کنید و از ساعت 16 (4 بعد از ظهر) تا ساعت 22 (10 شب) به فاصله یک ساعت و نیم، یک لیوان میل شود. 1 عدد قرص بیزاکودیل را ساعت 18 (6 عصر) و قرص بعدی را ساعت 23 (11 شب) میل کنید. لازم به ذکر است دستورالعمل داروها طبق روزهای داده شده است.

*بیماران پیوند کبد و نارسایی کلیوی و دیابت و سن بالای 80 سال حتما قبل از شروع به انجام آمادگی جهت چک آزمایش کراتنین به آزمایشگاه مراجعه کرده و جواب تست را با شماره **54534000** داخلی **3** اطلاع دهید.

- از **چهار روز** قبل از انجام کولونوسکوپی حبوبات، میوه و لبنیات میل نشود.
- از **چهار روز** قبل از انجام کولونوسکوپی هرگونه میوه های دانه دار مثل لنانر، انگور، کشمش، کیوی، هندوانه، گوجه فرنگی و بادمجان میل نشود.
- اگر دارو های خاصی مانند آسپرین یا سایر رقیق کننده های خون مانند وارفارین، پلاویکس، اسویکس و آپیکسابان، آکسابین و.... استفاده می کنید یا به دیابت و بیماری های قلبی ریوی و یا مغزی مبتلا هستید پزشک معالج و اپراتور وقت دهی خود را در جریان قرار دهید.
- اگر به بیماری واگیر دار ویروسی، تب خال، زگیل ناحیه تناسلی، هیپاتیت و ایدز مبتلا هستید حتما با ما در میان بگذارید.

- لطفا صفحه ی بعد را مطالعه بفرمایید.

- لطفا نوار قلب داشته باشید. روز قبل انجام شود یا روز انجام کار 1 ساعت زودتر مراجعه فرمایید تا انجام شود. لازم به ذکر است نوار قلب شما تا یک ماه اعتبار دارد.

- روز قبل از انجام کولونوسکوپی ساعت 7:30 صبح یک کف دست نان تست با عسل میل کنید ، از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ظهر، هیچ ماده غذایی جامدی حتی انواع میوه جات (حتی هندوانه و خربزه) میل نفرمایید، در این فاصله، (از ساعت 8 تا 12 ظهر) 8 تا 10 لیوان مایعات زلال و صاف شده (آب، چای کمرنگ و عسل ، شربت گلاب ، شربت به لیمو، شربت آب لیمو بدون پالپ و هر مایع شفافی که بتوان از پشت لیوان روزنامه خواند) میل کنید.

- ساعت 13 (1 بعد از ظهر) پودر نونا پگ اول را در نصف لیوان آب سرد حل کرده و به مدت ده دقیقه صبر کنید تا آن مایع به دمای محیط برسد و سپس میل کنید. پس از خوردن پودر تا ده دقیقه چیزی میل نشود. بعد از میل کردن پودر 2 عدد قرص بیزاکودیل میل شود.

- سپس (از ساعت 13:30 تا ساعت 19) حدود 10 تا 15 لیوان از مایعات شفافی که در بالا ذکر شد میل کنید.

- از فاصله ساعت 13 (1 بعد از ظهر) تا آخر شب به هیچ عنوان هیچ نوع ماده غذایی جامدی میل نفرمایید.

- ساعت 19 (7 بعد از ظهر)، پودر نونا پگ دوم را در نصف لیوان آب سرد حل کرده و بعد از اینکه به دمای محیط رسید آن را میل کنید، 2 عدد قرص بیزاکودیل هم میل کنید، پس از آن حدود 8 تا 10 لیوان مایعات شفاف ذکر شده میل بفرمایید.

- نوناپگ سوم را ساعت 23 در یک فنجان آب حل کرده و بعد از ده دقیقه میل کنید. به مدت 10 دقیقه 2 عدد قرص بیزاکودیل میل کنید پس از خوردن پودر چیزی میل نکنید و سپس 4 تا 5 لیوان مایعات شفاف ذکر شده میل بفرمایید.

- شیاف بیزاکودیل را شب قبل از انجام کولونوسکوپی ساعت 12 شب استفاده شود.

- از ساعت 12 شب تا هنگام انجام کولونوسکوپی ناشتا باشید حتی آب میل نکنید.