

آمادگی جهت انجام عمل جراحی اندوسکوپی پوام (POEM)

- از 5 روز قبل از انجام عمل به هیچ عنوان لبنیات مانند شیر و دوغ و ماست و غذای جامد حتی غذای میکس شده و مایعات چرب (مانند آب مرغ و آب گوشت و آب کله پاچه میل نکنید)
 - اگر داروهای رقیق کننده مانند آسپرین، وارفارین، پلاویکس، اسویکس، ریواروکسیبان، آپیکسابان، دابیگاتران و ... استفاده میکنید یا به دیابت و بیماری های قلبی ریوی، کلیوی و یا مغزی و ... مبتلا هستید از پزشک معالج خود مشاوره کتبی برای عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی بگیرید.
 - لازم است دارو های رقیق کننده خون حد اقل 5 روز قطع شوند
 - اگر به بیماری واگیردار از جمله هپاتیت، ایدز و یا زگیل تناسلی مبتلا هستید حتما با ما در میان بگذارید.
 - مایعاتی که شما میتوانید در طول این 5 روز میل کنید شامل (آب و چایی کم رنگ با عسل، شربت گلاب، شربت به لیمو، شربت آب لیمو بدون پالپ، آب کمپوت سیب، آب کمپوت گلابی، آب کمپوت آلوئه ورا، نوشابه کوکا و هر مایع شفافی که بتوان از پشت لیوان این متن را خواند). تاکید می شود حتما در این پنج روز آمادگی حتما روزی یک قوطی نوشابه کوکا میل شود.
 - از 5 روز قبل قرص فلوکونازول 100 میلی گرم صبح یک عدد و شب یک عدد میل کنید.
 - از 5 روز قبل قرص ایزوسورباید 10 میلی گرم صبح و ظهر و شب نصف قرص میل کنید .
 - آزمایشاتی که جهت انجام عمل شما لازم است داشته باشید شامل: CBC,DIFF,PT,PTT,INR و آزمایشات پزشک مشاور است .
 - جهت انجام این جراحی داشتن مشاوره پزشک بیهوشی و مشاوره پزشک قلب و داشتن نوار قلب در هرسنی الزامی است.
 - لطفا و الزاما 12 ساعت قبل از انجام عمل به هیچ عنوان هیچ چیزی حتی آب میل نکنید در صورت رعایت نکردن دستورات بالا عمل شما کنسل میشود .
 - لطفا بیماران برای روز انجام کار حتما گزارش مانومتری ، گزارش آندوسکوپی و باریوم را به همراه داشته باشند.
- لطفا یک نفر همراه داشته باشید و داشتن کارت ملی الزامی است.