

آمادگی جهت انجام عمل جراحی اندوسکوپی پوام (POEM)

- از ۵ روز قبل از انجام عمل به هیچ عنوان لبنیات مانند شیر و دوغ و ماست و غذای جامد حتی غذای میکس شده و مایعات چرب (مانند آب مرغ و آب گوشت و آب کله پاچه میل نکنید)
- اگر داروهای رقیق کننده مانند آسپرین، وارفارین، پلاویکس، اسویکس، ریواروکسیبان، آپیکسابان، دابیگاتران و ... استفاده میکنید یا به دیابت و بیماری های قلبی ریوی، کلیوی و یا مغزی و ... مبتلا هستید از پزشک معالج خود مشاوره کتبی برای عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی بگیرید.
- لازم است دارو های رقیق کننده خون حد اقل ۵ روز قطع شوند
- اگر به بیماری واگیردار از جمله هپاتیت، ایدز و یا زگیل تناسلی مبتلا هستید حتما با ما در میان بگذارید.
- مایعاتی که شما میتوانید در طول این ۵ روز میل کنید شامل (آب و چایی کم رنگ با عسل، نوشابه سیاه کوکاکولا، شربت گلاب، شربت به لیمو، شربت آب لیمو بدون پالپ، آب کمپوت سیب، آب کمپوت گلابی، آب کمپوت آلوئه ورا و هر مایع شفافی که بتوان از پشت لیوان این متن را خواند).
- از ۵ روز قبل قرص فلوکونازول ۱۰۰ میلی گرم صبح یک عدد و شب یک عدد میل کنید.
- از ۵ روز قبل قرص ایزوسورباید ۱۰ میلی گرم صبح و ظهر و شب نصف قرص میل کنید .
- آزمایشاتی که جهت انجام عمل شما لازم است داشته باشید شامل: CBC,DIFF,PT,PTT,INR و آزمایشات پزشک مشاور است .
- جهت انجام این جراحی داشتن مشاوره پزشک بیهوشی و مشاوره پزشک قلب و داشتن نوار قلب در هرسنی الزامی است.
- لطفا و الزاما ۱۲ ساعت قبل از انجام عمل به هیچ عنوان هیچ چیزی حتی آب میل نکنید در صورت رعایت نکردن دستورات بالا عمل شما کنسل میشود .
- لطفا بیماران برای روز انجام کار حتما گزارش مانومتری ، گزارش آندوسکوپی و باریوم را به همراه داشته باشند.
- ممکن است بعد از انجام عمل طبق دستور پزشک تا مدتی اجازه ی خروج از تهران را نداشته باشید
- لطفا یک نفر همراه فقط از بستگان درجه ی یک داشته باشید و داشتن کارت ملی الزامی است.