

مانومتري آنوركټال و بيوفيدبك چيست؟

مانومتري آنوركټال آزمائشي است كه ميزان عملكرد ركتوم و اسفنكتر مقعد را اندازه گيري مي كند .
آزمایش مانومتري آنوركټال معمولا براي افرادي كه بي اختياري مدفوع، يبوست و بيماري هيرشپرونك در
كودكان انجام مي شود

آمادگي انجام آنوركټال

روز قبل از انجام كار سوپ يا غذاي كاملا پوره شده ميل شود .

**روز انجام چهار ساعت قبل از عمل يك شياف گليسيرين را استفاده كنيد.مي توانيد اين دارو را از
داروخانه تهيه كنيد**

از-چهار. ساعت قبل از عمل چيزي نخوريد و ننوشيد

مي توانيد داروهاي مصرفي خود را تا دو ساعت قبل از عمل با جرعه هاي كوچك آب مصرف كنيد-

براي مانومتري هيچ آرامبخشي داده نمي شود و مي توانيد رانندگي كنيد-

حداقل 30 دقيقه قبل از زمان عمل در كلينيك تشريف داشته باشيد-

لطفا كارت ملي، ليست داروهاي مصرفي فعلا شما، كولونوسكوپي و ساير سوابق قبلي را با خود به همراه-
داشته باشيد

در صورت نياز به لغو نوبت يا تغيير زمان نوبت (زمانبندي مجدد)، لطفا حداقل 24 ساعت قبل با شماره-
هاي كلينيك **54534000** داخلي ۳. بخش اسكوپي تماس بگيريد

روش انجام آنوركټال چگونه است؟

براي انجام مانومتري آنوركټال، از شما خواسته مي شود كه گان يكبار مصرف بپوشيد .سپس به پهلوي
چپ خود دراز خواهيد كشيد .لوله كوچك و انعطاف پذير به اندازه يك دماسنج با يك بالون در انتهاي
آن (كاتتر (وارد مقعد مي شود .كاتتر به دستگاهي متصل است كه فشار هاي اسفنكتر و مقعد و ركتوم را
اندازه گيري مي كند .در طول آزمائش، بالون كوچك متصل به كاتتر ممكن است در ركتوم باد شود تا
ارزيابي شود

در زمان هاي مختلف از شما خواسته مي شود كه به مقعد فشار دهيد، استراحت كنيد يا خود را ننگه
داريد و فشار عضله اسفنكتر مقعد در طول هر يك از اين مانورها اندازه گيري مي شود .براي فشردن،
ماهيچه هاي اسفنكتر را سفت مي كند، انگار كه ميخواهد از بيرون آمدن چيزي جلوگيري كند .براي
فشار دادن يا پايين آوردن، بيمار فشار مي آورد كه گويي مي خواهد مدفوع كند

خطرات مانومتري آنوركټال چيست؟ مانومتري آنوركټال يك روش ايمن و كم خطر است و بعيد است كه
باعث ايجاد درد شود و عوارض آن نادر است

نتیجه تست: نتایج مانومتری معمولا چندین ساعت بعد در اختیار شما قرار میگیرد. لطفا در زمان اعلام شده با همه مدارك برای دریافت جواب در کلینیک حضور داشته باشید